



Sanierungsplan/ Eradikation

Grundsätzlich legt jede Klinik gemäß eigener Risikoanalyse im Hygieneplan das einrichtungsbezogene Vorgehen im Umgang mit MRE- Patienten fest

Eradikation bei Patienten

1. Pflege nach Hygienerichtlinie
2. Abstriche von Nase, Rachen und Perinealbereich, gegebenenfalls von Hautdefekten, z.B. Dekubitus, Wunden
3. Schon bei Verdacht mit den Dekolonisationsmaßnahmen (z.B. Nasensalbe, Waschung) Beginnen
4. Die Sanierung erfolgt über einen Zeitraum von **5 Tagen** nach dem unter aufgeführten Schema (sofern keine andere ärztliche Anordnung vorliegt)
5. Ohne Behandlungspause erfolgen erneute Abstriche an **3 aufeinanderfolgenden Tagen** an Nase, Rachen, Hautdefekten und allen zuvor positiven Lokalisationen
6. Wenn sich kein MRSA bestätigt, ist die Behandlung abzubrechen

Reihenfolge der Pflegetätigkeiten und Häufigkeiten

	Tag 1.	Tag 2.	Tag 3.	Tag 4.	Tag 5.	Tag 6.	Tag 7.	Tag 8.
1. tägl. Ganzkörperwäsche nach Anleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2. tägl. Haarwäsche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3. tägl. Verbände wechseln (bzw. nach Produktvorgabe) Pinseln von Wunden / Tracheostoma mit _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4. tägl. Wechseln von: • Bettwäsche • Bekleidung • Utensilien der Körperpflege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5. 3 x tägl. antiseptische Mundspülung (Gebiss zusätzlich dekontaminieren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6. 3 x tägl. Nasensalbe mit Turixin (Menge wie angegeben in den vorderen Bereich der Nase einbringen; Alternative: Octenisan-Nasengel®)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						Kontrollabstrich 1	Kontrollabstrich 2	Kontrollabstrich 3

Pausen vor den Abstrichen sind nach aktuellem Stand der Wissenschaft nicht mehr erforderlich.

WICHTIG:

- Generell wird mit Einmalartikeln gearbeitet (z.B. Einmalzahnbürste etc.)
- Persönliche Gegenstände (Brille, Rasierer, Gebiss, Zahnbürste etc.) werden im Zimmer belassen und **täglich** bzw. nach Gebrauch desinfiziert oder ausgetauscht
- auf Mupirocin-Resistenz ist zu achten, dann soll nur mit Octenisan-Nasengel gearbeitet werden
- bei Infektionen und positiver Blutkultur erfolgt die Antibiotikatherapie nach ärztlicher Verordnung